

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

1. Nilai sensitivitas HpSA pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik *suspect* terinfeksi *H. pylori* 33,33%.
2. Nilai spesifisitas HpSA pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik *suspect* terinfeksi *H. pylori* 95,45%.
3. Nilai prediksi positif HpSA pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik *suspect* terinfeksi *H. pylori* 50%.
4. Nilai prediksi negatif HpSA pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik *suspect* terinfeksi *H. pylori* 91,30%.
5. Nilai akurasi HpSA pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik *suspect* terinfeksi *H. pylori* 88%.

#### 7.2 Saran

1. Perlunya penelitian lebih lanjut HpSA dalam mendeteksi adanya infeksi *H.pylori* pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik pada kelompok tipe campuran (ansietas, depresi dengan stres).
2. Pemeriksaan HpSA tidak disarankan sebagai tes diagnostik dalam mendeteksi infeksi *H. pylori* pada penderita dispepsia fungsional dengan gangguan psikosomatik *suspect* terinfeksi *H. pylori*.